

Anexo I. Encuesta virtual: conocimientos de médicos especialistas sobre la dispepsia funcional

1. ¿Le resulta fácil definir la dispepsia?

Si
No

Sensación de plenitud
Saciedad precoz
Acidez
Sueño postprandial

2. ¿Conoce los criterios de Roma II?

Si
No

4. ¿Considera usted al *Helicobacter Pylori* un elemento etiológico?

Si
No

3. ¿Cuál es para usted el síntoma principal de la dispepsia?

Dolor o malestar abdominal
Distensión abdominal
Náuseas
Vómitos

5. ¿Considera que se lo debe investigar y tratar?

Si
No

6. ¿Le solicita estudios al pacientes antes de un tratamiento de prueba?

Si
No

7. Si la respuesta anterior es sí, ¿cuál de ellos?

Análisis de laboratorio
Seriada esófago-gastroduodenal
Endoscopia alta
Endoscopia baja
Ecografía
Tomografía computada
Electrogastrografía
Manometría antroduodenoeyunal
Estudio de vaciamiento gástrico
Otros

8. Si no responde al tratamiento de prueba, ¿qué estudios solicita?

Análisis de laboratorio
Seriada esófago-gastroduodenal
Endoscopia alta
Endoscopia baja
Ecografía
Tomografía computada
Electrogastrografía
Manometría antroduodenoeyunal
Estudio de vaciamiento gástrico
Otros

9. ¿Indica alguna dieta?

Si
No

10. Si la respuesta anterior es sí, ¿qué utiliza?

Una dieta pre-elaborada
Una dieta personalizada
Según el paciente

11. De las diferentes clasificaciones conocidas hasta el momento, ¿cuál cree usted que es la más acertada?

Fermentativa-putrefactiva
Hiposténica-hiperesténica
Ulcerosa-no ulcerosa
Tipo dismotilidad-tipo reflujo-tipo ulcerosa
Todas ellas
Ninguna de ellas

12. ¿Cuáles son para usted los fármacos más útiles?

Antiespasmódicos
Prokinéticos
Colagogos-coleréticos
Antinflatulentos
Antiácidos
Bloqueantes H2
Bloqueantes de la bomba de protones
Antibióticos
Prebióticos
Ansiolíticos
Antidepresivos
Otros

13. ¿Cómo los indica?

En forma permanente
Cíclicamente
Según lo que el paciente coma
Deja que lo maneje el paciente

14. ¿Cuántos pacientes con dispepsia calcula que atiende usted mensualmente?

0 a 25
25 a 50
50 a 100
Más de 100

15. ¿Qué porcentaje representa el paciente dispéptico en sus consultas diarias?

0-10%
10-20%
20-30%
30-40%
Más del 50%

16. ¿En qué porcentaje de pacientes dispépticos suele encontrarse enfermedad orgánica?

0-10%
10-20 %
20-30%
30-40%
40-50%
Más del 50%