

Invitamos a los lectores de Acta a que envíen casos con interés clínico o diagnóstico para su publicación en esta sección. Editor Dr R. Mazure.

Lesión hepática quística

Hugo Daniel Ruiz, Mariano Palermo, Gary Duran, Otto Ritondale, Bruno Miguel

Servicio de Cirugía General Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas. Villa Sarmiento, El Palomar. Provincia de Bs. As., Argentina

Paciente femenino de 62 años que consulta por intolerancia a colecistoquinéticos (ICCK) y cólicos biliares a repetición, sin otros antecedentes patológicos. Es derivado a nuestra institución con diagnóstico de litiasis vesicular múltiple y quiste hepático simple. Trae ecografía con imagen hipocogénica con refuerzo sónico posterior en segmentos laterales izquierdo del



Figura 1.



Figura 2.

hígado (Figura 1) y tomografía axial computada (TAC) abdominal (mayo de 2005). (Figura 2)

No refiere antecedentes canaliculares, por lo que se realiza laboratorio con marcadores virales, enzimas de masa ocupante y arco 5 para descartar hidatidosis. La paciente vivió hasta la adolescencia en la Provincia de Corrientes, (noreste de Argentina).

Los resultados de laboratorio fueron todos normales, con una leve elevación de la fosfatasa alcalina (FAL) de 478 UA/dl (valor normal 350). Arco 5 negativo.

Se realiza nueva tomografía. (Figura 3)




Figura 3.

Con estas imágenes, ¿en qué diagnóstico piensa?

Correspondencia: Hugo Daniel Ruiz
Santos Dumont 2719, piso 8 Dto D. (1426). Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
E-mail: drhugoruiz@hotmail.com
hugoruiz@ciudad.com.ar

Resolución del caso en la página 91