

Invitamos a los lectores de Acta a que envíen casos con interés clínico o diagnóstico para su publicación en esta sección. Editor Dr R. Mazure.

Lesión cutánea y enfermedad digestiva

Nelia Hernández,¹ Daniela Chiodi,¹ Marcel Keuchkerian²

¹ Clínica de Gastroenterología y ² Clínica Quirúrgica A. Hospital de Clínicas, Montevideo, Uruguay

Se trata de un hombre de 68 años, fumador y alcohólico a quien, durante la evaluación de las repercusiones hepáticas de su adicción, se encontró una hepatomegalia aumentada de consistencia y en cara posterior de tronco se evidenciaron múltiples pápulas hiperqueratósicas pigmentadas que refería presentar desde hacía varios meses. La ecografía abdominal mostró un nódulo hiperecogénico de 25 mm en el segmento VIII, con dosificación del alfa fetoproteína normal. La tomografía evidenció en el segmento VIII un nódulo hipodenso de 2 cm de diámetro, que realizaba en la fase arterial y se volvía hipodenso en la fase portal. Los cortes torácicos no mostraron lesiones. La biopsia hepática corroboró la presencia de una cirrosis. Las videoendoscopías digestivas alta y baja fueron normales. Con el diagnóstico de carcinoma hepatocelular se realizó una hepatectomía derecha, previa embolización portal. El estudio histológico de la pieza operatoria confirmó el diagnóstico planteado y a 11 meses de operado el paciente se encuentra sin evidencia de recidiva tumoral. Las lesiones de piel han tenido una lenta involución mostrándose menos pigmentadas, más pequeñas y menos prominentes.



¿Conoce usted este signo dermatológico y su relación con enfermedades digestivas?

Correspondencia: Nelia Hernández
Michigan 1555 (11400). Montevideo, Uruguay.
E-mail: nelia@adinet.com.uy

Resolución del caso en la página 92