

Imagen tomográfica infrecuente en patología biliar

Marcelo Zicari,¹ Augusto Nápoli,² Santiago Oria,² Daniel Cavalitto³

¹ Cirugía, Clínica Espora.

² Diagnóstico por imágenes, Centro de Tomografía Computada Adrogué.

³ Clínica Médica, Clínica Espora.


Adrogué, Provincia de Buenos Aires, Argentina.

Recibido: 03/02/2015 / Aprobado: 30/06/2015

Paciente de 29 años de edad que ingresa a nuestra institución con un cuadro de dolor abdominal en hipocondrio derecho y vómitos. Tiene antecedentes de intolerancia digestiva a los colecistoquinéticos. Examen físico: abdomen blando, con dolor a la palpación en hipocondrio derecho sin defensa ni reacción peritoneal. Datos positivos de la-

boratorio: Leucocitosis ($11.300/\text{mm}^3$), hiperbilirrubinemia (1,3 mg/dl a predominio directo). Resto sin alteraciones. Ecografía abdominal: vía biliar intra y extrahepática no dilatada. Vesícula de paredes finas con litiasis vesicular múltiple. Se efectuó una TC de abdomen cuyas imágenes son motivo de la actual presentación (Figura 1).

Figura 1.



Correspondencia: Marcelo Zicari
Av Espora 645, Adrogué, Buenos Aires, Argentina
Correo electrónico: mzcicari@intramed.net

¿Cuál sería su diagnóstico?

Resolución del caso en la página 273