

Complicación alejada de traumatismo toracoabdominal cerrado

Ignacio Germán Solari, Walter Otero, Hugo Daniel Ruiz, Otto Ritondale, Juan Solé, Francisco Villanueva, Francisco Tarsitano

Servicio de Cirugía General, Hospital Profesor A Posadas. Buenos Aires, Argentina.

Acta Gastroenterol Latinoam 2016;46:80

Recibido: 01/06/2015 / Aprobado: 09/05/2016 / Publicado en www.actagastro.org el 04/07/2016

Se presenta el caso de un paciente de sexo masculino de 42 años de edad con antecedente de traumatismo toracoabdominal cerrado hace 7 meses y que requirió avenamiento pleural izquierdo por hemo neumotórax.

El motivo de consulta fue disnea súbita asociada a vómitos alimentarios y luego biliogástricos. En el examen

físico presentó hipoventilación en campo pulmonar izquierdo con matidez a la percusión; no se constató signos de irritación peritoneal ni leucocitosis.

Se solicitó como estudio complementario telerradiografía de tórax y tomografía axial computada de tórax y abdomen.

Figura 1. Telerradiografía de tórax.



Figura 2. Tomografía axial computada.



¿Cuál es su diagnóstico y qué tratamiento indicaría?

*Correspondencia: Hugo Daniel Ruiz
Correo electrónico: drhugoruiz@hotmail.com*

Resolución del caso en la página 173