

Dolor abdominal agudo y suboclusión intestinal

Hugo Gerónimo Altieri Mohedano, Nebil Larrañaga, Germán Espil, Juan Pablo Dos Ramos Alferes, Shigeru Kozima

Servicio de Diagnóstico por Imágenes, Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

Acta Gastroenterol Latinoam 2018;48(2):71

Recibido: 24/03/2017 / Aceptado: 23/10/2017 / Publicado online el 18/06/2018

Caso clínico

Paciente de sexo femenino, de 18 años, que concurre al servicio de emergencias presentando dolor epigástrico agudo e intermitente de 6 horas de evolución. Semiológicamente el dolor empeora con la ingesta y se asocia con náuseas y vómitos de tipo biliosos. Al examen físico, llama la atención la marcada distensión abdominal. Se solicitan como estudios complementarios una ecografía abdominal (Figura 1), un tránsito de intestino delgado con contraste hidrosoluble (Figura 2) y una tomografía computada con contraste oral y endovenoso (Figura 3).

Figura 1. Ecografía de abdomen con doppler color.




Figura 2. Tránsito de intestino delgado con contraste hidrosoluble.





Figura 3. Tomografía computada de abdomen con contraste oral y endovenoso.



Correspondencia: Hugo Altieri Mohedano
Pi y Margall 750. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
Tel.: 0381 - 156371174
Correo electrónico: hugoaltieri@hotmail.com

¿Qué diagnóstico le sugieren estas imágenes?

Resolución del caso en la página 144